

Листовка: Информация за потребителя

2058033

Брой № .....

35258

05-12-2013

Изявление № .....

Тонзилотрен таблетки

Tonsilotren tablets

Одобрение № .....

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте т. 4.
- Ако след 2 дни не се почувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.


**Какво съдържа тази листовка**

1. Какво представлява Тонзилотрен и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемате Тонзилотрен
3. Как да приемате Тонзилотрен
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Тонзилотрен
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

**1. Какво представлява Тонзилотрен и за какво се използва**

Тонзилотрен е хомеопатично лекарство за лечение на остри и хронични рецидивиращи тонзилити, увеличаване на слизиците в детската възраст и лечение след хирургично отстраняване на слизиците

Тонзилотрен е комбинация от пет добре доказани отделни хомеопатични средства, която е особено подходяща за лечение на възпаления на лимфните жлези, обграждащи гърлото – като остри фарингити, остри катарални или тонзиларни ангини, а също така и при оперативно отстраняване на слизиците (тонзилектомия). *Атропинум сулфурикум* има положителен ефект при началните температурни фази, които включват зачервено гърло, подути слизици и характерни подтици за прегълъщане. Останалите четири компонента на Тонзилотрен се допълват взаимно в лечението на подострите до хронични случаи, често придружени с формиране на мукус (слуз). *Меркуриус бийодатус* е особено подходящ за успокояване на слизиците, както и на лимфните жлези при фарингит. *Хепар сулфурикус* има положително действие върху упоритите и повтарящи се възпаления, както и върху острите болки, които се разпростираят към ушите. *Калиум бихромикум* спомага за преодоляване на трудностите с прегълъщането.



успокоява узлемените слизици и съдейства за премахване на полипите. Силицея ускорява оздравителния процес при възпаленията и намалява податливостта към инфекции, чрез стимулиране на имунната система. Като цяло, Тонзилотрен, благодарение на синергетичния си ефект, осигурен от петте активни съставки, осигурява ефективност през всички фази на възпалението от началните оплаквания до излекуване на рецидивите. Тонзилотрен е доказал клиничната си ефективност в лечението на увеличени слизици.

## **2. Какво трябва да знаете преди да използвате Тонзилотрен**

### **Не използвайте Тонзилотрен**

- ако сте алергичен към хром, живак или към някое от другите активни вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в т.6)
- при деца под 2 годишна възраст.

### **Предупреждения и предпазни мерки**

Консултирайте се с Вашия лекар, ако страдате от заболяване на щитовидната жлеза.

### **Консултирайте се с Вашия лекар**

- ако острото Ви състояние не се подобри или се влоши след първите 2 дни от лечението,
- ако възникнат допълнителни оплаквания, например температура над 39°C.

### **Деца**

Не използвайте Тонзилотрен при деца под 2 годишна възраст.

### **Други лекарства и Тонзилотрен**

Не са наблюдавани взаимодействия с други лекарства. Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, насърко сте приемали или може да приемате други лекарства.

### **Тонзилотрен с храна, напитки и алкохол**

Действието на хомеопатичните лекарства може да бъде неблагоприятно повлияно от вредни фактори на житейските навици, както и от стимуланти, алкохол и тютюн.

### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Посъветвайте се с Вашия лекар преди да приемете това лекарство.

### **Шофиране и работа с машини**

Тонзилотрен не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

### **Тонзилотрен съдържа лактоза (млечна захар) и захароза**

Ако Ви е казано от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемате този продукт.

## **3. Как да приемате Тонзилотрен**



Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Препоръчелната доза е:

**Възрастни:** при *остри състояния* да се приема по 1 таблетка на всеки час до максимум 12 таблетки на ден, докато настъпи подобрене. За *последващо лечение и при хронично състояние*, да се приемат 1-2 таблетки 3 пъти на ден.

#### **Употреба при деца**

**Деца на възраст от 2 до 6 години:** при *остри състояния и за последващо лечение или при хронични състояния*, да се приема по 1 таблетка 3 пъти на ден.

**Деца на възраст от 6 до 12 години:** при *остри състояния* да се приема по 1 таблетка на всеки 2 часа, до максимум 6 таблетки на ден, докато настъпи подобрене. За *последващо лечение или при хронични състояния*, да се приема по 1 таблетка 3 пъти на ден.

**Деца на и над 12 години:** при *остри състояния* да се приема по 1 таблетка на всеки час до максимум 12 таблетки на ден, докато настъпи подобрене. За *последващо лечение и при хронично състояние*, да се приемат 1-2 таблетки 3 пъти на ден.

Възрастни и деца с *увеличени сливици* приемат 1 таблетка 3 пъти на ден. Препоръчено е лечението да продължи 6-8 седмици.

При *хронични и рецидивиращи състояния* е полезно провеждането на няколко курса на лечение годишно, всеки от които по 6-8 седмици.

Таблетките трябва да се оставят да се разтопят бавно в устата.

За малки деца е възможно таблетките да се стриват и след това да се разтварят в малко вода.

Не трябва да приемате това лекарство заедно с храна и напитки. Необходимо е да има интервал от поне половин час.

**Ако сте приели повече от необходимата доза Тонзилотрен**  
Не се очакват вредни ефекти в случай на предозиране.

**Ако сте пропуснали да приемете Тонзилотрен**  
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

**Ако сте спрели приема на Тонзилотрен**  
Не се очакват вредни ефекти.

Ако имате някакви други въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.



#### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

В много редки случаи могат да възникнат реакции на свръхчувствителност като кожен обрив. В тези случаи се консултирайте с Вашия лекар.

Ако получите увеличаване на слюноотделянето, намалете дозата или спрете приема на Тонзилотрен.

**Забележка:** Съществуващите оплаквания могат временно да се влошат, когато се приемат хомеопатични лекарства (начално хомеопатично влошаване). В тези случаи спрете приема на Тонзилотрен и се консултирайте с Вашия лекар.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите никакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата:

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg)

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

#### **5. Как да съхранявате Тонзилотрен**

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!


Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

#### **6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация**

##### **Какво съдържа Тонзилотрен**

- Активните вещества са: Атропинум сулфирикум (Atropinum sulfuricum ) trit. D5 12,5 mg, Хепар сулфурис (Hepar sulfuris ) trit. D3 10 mg, Калиум бихромикум (Kalium bichromicum ) trit. D4 50 mg, Силицея (Silicea ) trit. D2 5 mg, Меркуриус биодатус (Mercurius bijodatus ) trit. D8 25 mg в 1 таблетка (250 mg).



- Другите съставки са: Захароза, лактозаmonoхидрат, магнезиев стеарат.

**Как изглежда Тонзилотрен и какво съдържа опаковката**

20 таблетки в блистери от алуминий и PVC в картонена опаковка и инструкция за употреба. 60 таблетки в опаковка.

**Притежател на разрешението за употреба и производител:**

Deutsche Homöopathie-Union,  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe  
Германия

За допълнителна информация за това лекарство, моля обърнете се към локалния представител на Притежателя на разрешението за употреба:

Алпен Фарма ООД  
България

**Дата на последно преразглеждане на листовката:**

11/2016

